

GUÍA MANICA CUCURBITÁCEAS DE PIEL COMESTIBLE

ESTADOS FENOLÓGICOS							
							
Trasplante	15 días después del trasplante	Hojas desplegadas	Primeras flores	Floración y cuajado	Desarrollo del fruto	Maduración	Cosecha

Enfermedades	Mildiu (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	MANIFLOW - CALDO MANICA 20 WG	
		OSSIRAME 35 WG - OSSIRAME 50 WP	
	Oídio (<i>Podosphaera spp</i>)	LIMOCIDE	
		ZOLVIS	
Alternaria (<i>Alternaria pluriseptata</i>)	CALDO MANICA 20 WG		
	OSSIRAME 30 WP - OSSIRAME 35 WG - OSSIRAME 50 WP		
Bacteriosis	CALDO MANICA 20 WG		
	OSSIRAME 30 WP - OSSIRAME 35 WG - OSSIRAME 50 WP		
Plagas	Pulgón (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i>)	ASSET FIVE	
		METEOR	
	Mosca blanca (<i>Aleyrodidae</i>)	LIMOCIDE	
		METEOR	
	Araña Roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	ZOLVIS	

Para ampliar la información sobre las dosis, mezclas y cualquier otra cuestión, póngase en contacto con nuestro distribuidor de la zona o con el servicio técnico.

GUÍA MANICA CUCURBITÁCEAS DE PIEL COMESTIBLE



Bioestimulantes	Protector solar					MANISOL / MANISOL ZERO / CLE'FLO	
	Floración y cuajado	TIYATI					
	Estrés abiótico y estimulación defensas		VITELICE P				
Correctores	Corrector calcio	ABIES Ca					
	Corrector micros	ABIES Mix					
	Corrector hierro	ABIES Fe					
	Corrector cobre	FERTUS ZEO					
FERTICUS 3							

Para ampliar la información sobre las dosis, mezclas y cualquier otra cuestión, póngase en contacto con nuestro distribuidor de la zona o con el servicio técnico.