

GUIA MANICA BRASSICAS

ESTÁDIOS FENOLÓGICOS



Doença	Mildio <i>(Hyaloperonospora parasitica, Phytophthora infestans)</i>		KITOMANI					
	Alternaria <i>(Alternaria brassicae)</i>		KITOMANI					
	Botrite <i>(Botrytis cinerea)</i>		KITOMANI					
Pragas	Mosca branca <i>(Aleuyrodes proletella)</i>		LIMOCIDE					
	Tripes <i>(Thrips sp.)</i>		LIMOCIDE					
Bioestimulantes	Desenvolvimento da inflorescência		TIYATI					
	Estimulação das defesas e stress abiótico			VITELICE P				

Para mais informações, sobre doses, misturas, ou qualquer outra questão, contacte com o nosso distribuidor da sua zona, ou com o nosso serviço técnico

GUIA MANICA BRASSICAS

ESTÁDIOS FENOLÓGICOS								
								
Germinação	Desenvolvimento foliar	7 folhas ou mais desdobradas	O repolho começa a formar-se	20% do diâmetro do repolho	30% do diâmetro do repolho	50% do diâmetro do repolho	70% do diâmetro do repolho	Colheita

Corretores	Corretor de deficiência de cobre			FERTICUS HYDRO 50 WG		
				FERTICUS ZEO		
				FERTICUS 50 WP/WG		
				NEDCU		
				FERTICUS 700		
	Corretor de deficiência de cobre, enxofre e manganês			FERTICUS 3		
	Corretor de deficiência de micros			ABIES MIX		

Para mais informações, sobre doses, misturas, ou qualquer outra questão, contacte com o nosso distribuidor da sua zona, ou com o nosso serviço técnico

